



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE



FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

GLOSARIO DE TÉRMINOS

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PRODUCCION DE ANIMALES
CINEGETICOS**

Código: AGA459_2

NIVEL: 2



Absceso: Infección de la piel, caracterizada por una hinchazón y una acumulación de pus.

Alimento natural: Alimento que se sirve a los animales de la granja en las mismas condiciones que lo encontraría en la naturaleza, sin sufrir ninguna transformación.

Alimento rehusado: Aquel que los animales de la granja no consumen sin razón aparente.

Anillado: Consiste en colocar un aro identificativo en la pata de las aves cinegéticas con los datos de producción que le corresponden.

Ave cinegética: Cada una de las aves objeto de caza legal, cuya crianza y producción es posible en cautividad; en el caso que nos ocupa, perdiz, codorniz, y faisán.

Bioterio: Lugar dentro de las instalaciones de una granja cinegética donde se crían, las aves cinegéticas.

Bolo rumial: Dispositivo electrónico para la identificación de un rumiante, consistente en un microchip encapsulado en material biocompatible. El animal traga el bolo y queda alojado en su estómago.

Cajas de traslado: Jaulas metálicas, de madera o cartón ventilados donde se introducen las aves cinegéticas para su traslado entre instalaciones o hacia los lugares donde van a ser soltadas.

Camilla quirúrgica: Camilla preparada con diferentes sistemas de inmovilización, que permite hacer los cuidados sanitarios más complejos a las reses.

Cercado de cría: Porción de terreno circunscrito dentro de un vallado o cerca y destinado a la atención, cuidado y alimentación del ganado durante su desarrollo y crecimiento.

Complemento nutricional: Los complementos nutricionales son preparados que aportan una cantidad de nutrientes, proteínas, fibra, vitaminas y minerales, como complemento a la dieta diaria.

Complemento vitamínico mineral: Sustancias nutricionales que contienen las vitaminas o aminoácidos esenciales y minerales necesarios para corregir las deficiencias que de éstos nutrientes puedan existir en las raciones alimentarias.



Cortejo: Comportamiento de los machos de las diferentes especies con objeto de hacer que la hembra entre en celo, y poder realizar la cópula.

Crotal: Identificación, generalmente de plástico, que se le coloca al animal en la oreja, para conocer los datos de explotación de origen del animal.

Cubrición: Acoplamiento entre el macho y la hembra para que deposite el semen en el conducto genital de la misma y pueda producirse la fecundación.

Densidad: Número de animales por unidad de superficie (individuos por ha).

Depredador: Cualquier animal que, para subsistir, da caza y muerte a otro denominado presa.

Descorrear: Soltar la piel o terciopelo que cubre las cuernas que están creciendo. Se suele hacer cuando ha terminado el mismo y va a empezar el periodo de celo.

Desinfección: Procedimiento mediante el cual se eliminan los organismos patógenos (virus, bacterias, hongos, etc.) que puedan causar enfermedades en las aves cinegéticas.

Desinsectación: Procedimiento mediante el cual se previene y controla la presencia de insectos nocivos para las aves cinegéticas.

Destetar: Interrupción de la relación directa que se establece entre madre-hijo y que se fundamente en la lactación, separando a los animales lactantes de la madre y llevándolos a distintos compartimiento.

Divorcio: Ruptura que se produce en una pareja reproductora de aves cinegéticas ya formada.

Dosis seminal: Cantidad de semen necesario para efectuar una inseminación artificial de forma que, según la especie, y aplicado de una sola vez, ésta se realice con altas probabilidades de éxito en la fecundación.

Eclosión: Momento en el cual se produce la ruptura de la cáscara del huevo debida al empuje que desde el interior ejerce el pollo una vez que ha completado su desarrollo.

Embrionaje: Procedimiento de desarrollo del huevo fecundado.

Encajonar: Introducir a las reses en los cajones de transporte, que serán bastantes angostos para que evitar que el animal pueda dañarse.

Estado productivo: Cada una de las fases por las que pasan los animales dentro de la granja durante un ciclo productivo.



Expedición: Acción por la que sacamos animales de nuestra granja con destino a una repoblación en su medio natural.

Fase paridera: Momento del ciclo productivo de las hembras en el que empiezan a parir las crías.

Fotoestimulación: Ciclo o período de tiempo durante el cual las aves cinegéticas son sometidas a tratamientos de inducción de celo o puesta.

Fotoperíodo: Espacio de tiempo (horas de luz) que necesitan las aves cinegéticas para entrar en celo.

Guía transporte: Guía administrativa que tienen que tener todos los animales que se transportan, donde se acredita que cumplen con toda la normativa sanitaria.

Gusanera: Enfermedad causada por la larva de una mosca (*Cochliomya* sp.) La infección empieza por cualquier herida abierta donde la mosca pone los huevos. Las larvas se desarrollan en sentido vertical a la herida, provocando un olor desagradable que atrae a otras moscas. El animal se debilita, pudiendo llegar a morir.

Habitáculo: Cada uno de los diferentes apartados que tenemos en la nave de manejo, donde las reses esperan su turno para recibir el correspondiente tratamiento.

Hábitat Natural: Lugar que presenta las condiciones óptimas para que viva una especie en concreto.

Hembra gestante: Animales que se encuentran en la fase fisiológica del ciclo reproductivo que se inicia con la cubrición y que finaliza con el parto”.

Hembra vacía: Hembra que después de la cubrición no está preñada.

Incubación: Periodo de tiempo que transcurre desde que el huevo es fecundado hasta su eclosión. Durante todo este tiempo debe controlarse la humedad y temperatura del mismo.

Incubadora: Dispositivo utilizado para la incubación artificial de huevos. Para obtener los mejores resultados, deben permitir un control automatizado y continuo de temperatura y humedad ambiental, mediante forzadores de aire, termostatos y temporizadores.

Inmovilización física: Tipo de técnica de inmovilización en la que solo se emplean métodos físicos, con herramientas y maquinaria.



Inmovilización química: Inmovilización del animal con productos químicos, como tranquilizantes o somníferos.

Inseminación: Llegada del semen al óvulo mediante la cópula sexual.

Inseminación artificial: Técnica de reproducción asistida sencilla que consiste en el depósito de espermatozoides de manera no natural en el aparato reproductor de una hembra con el fin de conseguir una gestación.

Itinerario: Ruta controlada que deben seguir los animales en la granja para trasladarlos de una zona a otra.

Jaulones: Espacios cerrados en los que se introduce a las aves cinegéticas en diferentes etapas de su desarrollo.

Lagomorfo cinegético: Orden perteneciente a los mamíferos placentarios herbívoros de pequeño y mediano tamaño, cola corta y pelaje denso y suave, que se caracterizan por tener un segundo par de incisivos en la mandíbula superior, y que puede ser objeto de caza como los conejos y las liebres.

Lagomorfo de renovación: Lagomorfo nuevo que sustituye o reemplaza a individuos añosos, defectuosos o destinados a la venta.

Lote: Es un grupo de animales con ciertos caracteres comunes o análogos y que se agrupan con un fin determinado. En producción animal el manejo por lotes suele hacer referencia a un sistema de manejo con parideras planificadas.

Lotes en descanso: Grupo de aves cinegéticas que no se tiene en reproducción.

Lotes en estimulación: Grupo de aves cinegéticas en fase de fotoestimulación.

Manga ganadera: Elemento indispensable en el manejo animal. Es un pasillo que comunica con los cercones y naves de manejo. Debe tener una altura superior al ganado, y construidas de forma que no exista visión del medio externo y las reses no puedan fugarse por roturas o gateras.

Marcaje: Tiene como objetivo principal conocer la identidad de los animales para conseguir diferentes fines. Los sistemas de marcado o marcadores pueden ser divididos en tres grandes grupos: permanentes (marcas, tatuajes, microchips), semipermanentes (apliques como las etiquetas y aretes en las orejas) y temporales (cintas y pintura de pelo).

Micrichip: Circuito electrónico diminuto y encapsulado en vidrio biocompatible, del tamaño de un grano de arroz que se inyecta bajo la piel del animal mediante una simple inyección. Lleva grabado un código único, inalterable e irrepetible que identifica permanentemente al individuo.



Monta: Es la cubrición que tiene lugar cuando el macho y la hembra están juntos. Puede ser libre, desconociéndose la fecha del salto, o controlada y dirigida, cuando los dos sexos están separados y el macho es conducido ante la hembra en celo para montarla.

Nacedora: Lugar al que se trasladan los huevos a punto de eclosionar.

Nave de manejo: Construcción cerrada y compartimentada de tal forma, que permite la entrada de reses y su posterior manejo.

Necropsia: Procedimiento científico realizado después de la muerte de una animal para determinar la causa de la misma.

Nidal: Espacio dentro de la jaula de reproductores destinado a la puesta de huevos.

Ovoscopio: Instrumento utilizado para conocer si un huevo está fecundado y el estado del embrión dentro del huevo.

Paridera: Periodo ininterrumpido de tiempo comprendido entre el momento del primer parto de un lote de hembras gestantes y el parto de la última hembra.

Parques de aclimatación: Terreno en el interior de una granja, cercado y destinado a la adaptación fisiológica de un individuo a unas nuevas condiciones de vida o cambios en su medio ambiente.

Parque de cría: Lugar al que se trasladan las aves cinegéticas tras su primer desarrollo.

Parque residencia: Grandes extensiones de terreno valladas adecuadamente, lo más parecido posible al hábitat natural de los animales, donde viven todo el año, y solo son molestados en las épocas de reproducción, aprovechando para hacer todo el manejo.

Parque de vuelo: Lugar espacioso al que se trasladan las aves cinegéticas para que éstas desarrollen su capacidad de vuelo.

Pollo: Ave de poca edad (días), resultado del desarrollo completo del embrión dentro del huevo.

Producto en verde: Alimento vegetal natural, administrado en fresco, que no ha sufrido modificaciones en sus caracteres o composición y donde no se altera la naturaleza del mismo.



Programa alimenticio: Planificación de la alimentación de los animales de la explotación, de forma que cada uno recibe la dieta adecuada según su estado productivo.

Pseudegestación: Estado de falsa gestación o preñez que se produce por causas naturales y de supervivencia en el que se mantienen las funciones gestantes aún cuando no se ha producido una fecundación.

Ración específica: Conjunto de alimentos que proporcionan los nutrientes para cubrir las necesidades del animal y que son ingeridos durante 24 horas

Recepción: Actividad de la explotación por la que se recibe y conduce a su lugar adecuado un lote de animales llegados a la explotación.

Reemplazamiento: Sustitución o retirada del macho cuando se produce un divorcio.

Reproductores: Animales machos no castrados que se utilizan como sementales.

Repudios: Rechazo, por parte de la hembra, del macho introducido en el nidal para su apareamiento.

Sexado: Acto mediante el cual se determina el sexo de las aves cinegéticas.

Sincronización de celo: Provocar la aparición de celos conjuntos mediante la utilización de progestágenos, lo que permite cubrir a un número determinado de hembras en un tiempo sumamente corto, facilitando el manejo de las hembras para la monta natural o la inseminación artificial y agrupar las parideras, además de conocer datos como: fecha probable de parto, fecha probable de destete, fecha probable de venta.

Tatuaje: Método de marcaje permanente de los animales. El equipo para tatuar consiste en una herramienta semejante a un alicate, con un juego de letras y números, que tienen una serie de proyecciones afiladas como agujas para perforar la oreja. Una vez perforada ésta, se frota tinta indeleble sobre las diminutas perforaciones. Cuando cicatriza, el tatuaje queda permanente.

Topar: Dar con la cabeza contra alguno de los elementos de las instalaciones.

Tratamiento colectivo: Tratamiento realizado a todo un lote de animales.

Tratamiento corta distancia: Tratamiento realizado de manera individual, con el animal inmovilizado.

Tratamiento curativo: Tratamiento para curar cualquier tipo de herida o enfermedad presente en los animales de la explotación.



Tratamiento hormonal: Tratamiento realizado con hormonas para poder sincronizar los celos.

Tratamiento preventivo: Tratamiento cuyo objetivo es evitar la aparición de algún problema sanitario en la explotación.

Ungulado cinegético: Ungulado es todo mamífero cuyas extremidades terminan en pezuñas, y cinegético aquella especie que la normativa de caza indica como cazable. En España cumplen este requisito Ciervo, Corzo, Gamo, Cabra Montes, Rebeco, Muflón y Arruí (introducido).